

Pour tout autre problème n'hésitez pas à téléphoner à la Clinique...

Dans tous les cas le drain est retiré après quelques jours, en général lorsque l'écoulement se réduit à moins de 40 ml par 24 heures.



Capiro Bayonne

Cachet du médecin

Quitter la clinique avec un drain



Capiro Bayonne

www.capiro.fr/bayonne

Clinique Lafargue

Rue Gentil Ader
64100 Bayonne
05 59 46 05 05

Clinique Lafourcade

Avenue du Dr Lafourcade
64100 Bayonne
0826.96.64.64

Clinique Paulmy

Allées Paulmy
64100 Bayonne
05 59 46 06 00

Clinique St Etienne

Rue Jules Balasque
64100 Bayonne
05 59 50 33 33

Urgences 24h/24h
05 59 50 38 50

Quitter la clinique avec un drain

Qu'est-ce qu'un drain ?

Le drain a pour but d'évacuer la lymphe (liquide jaune pâle) qui s'accumule dans les zones opérées du sein, de l'aisselle, ou du dos (en cas de reconstruction par lambeau dorsal).

L'intérieur du flacon plastique est sous vide d'air ce qui permet une aspiration continue. Ainsi le contenu du flacon ne peut pas refluer dans la zone opérée.

Le bouchon soufflet est un indicateur de vide et donc de bon fonctionnement du système. Le tuyau relié au flacon est tenu à la peau par un fil de suture.

Il existe un raccord au milieu du tuyau susceptible de se défaire en cas de traction forte.



Un système d'attache permet de maintenir le drain à la ceinture sous les vêtements. Il peut également être placé dans un sac de transport (non fourni), il n'est pas recommandé de le laisser traîner à terre.

Surveillance et changement

Toutes les 48h et jusqu'à qu'il soit retiré, **le drain doit être vérifié et changé à la Clinique** (Un Rendez-vous vous a été donné).

Quels sont les problèmes éventuels ?


Si vous tirez violemment sur le drain ou si vous marchez dessus le raccord se sépare au milieu du tuyau et le flacon perd son aspiration.

→ Remettez le raccord le plus proprement possible et rendez vous à la clinique pour changer le drain (sans urgence).

Laisser le flacon au dessous de la taille pour éviter que le contenu du flacon reflue dans la zone opérée.

Si le flacon perd spontanément le vide

→ Rendez vous à la clinique pour changer le drain (sans urgence). Laisser le flacon au dessous de la taille pour éviter que le contenu du flacon reflue dans la zone opérée.



Il peut arriver que le drain se bouche dans la zone opérée par des petits caillots de sang ou de lymphe épaisse, ceci se traduit par un arrêt d'écoulement dans le flacon et des fuites dans le pansement (pansement taché et humide).

→ Rendez vous à la clinique pour enlever le drain (sans urgence).